

プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2024/6/3

11:35

プロトコル名称 Cmab①⑤+ENCO±BINI連日 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2024/ 5/15 14:14
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2024/ 2/29	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 67.5IU/l	以上	ALT 82.5IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注 100mL デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン)	皮下埋込型一般注射液 初回はデキサート量注意 1 瓶 2 A	00:00					
Rp 02 中心静脈注射 レスタミン服用 ピラフトビ300mg連日内服 大塚生食注 100mL	皮下埋込型一般注射液 30分かけて メクトビ併用時は90mg連日内服 1 瓶	00:00					
Rp 03 中心静脈注射 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液 100mg 20mL 入りきらないので生食抜いて調製する	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 500 mg/m ²	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL	皮下埋込型一般注射液 アービタックスと同じ投与速度でフラ 1 袋	00:00					
	続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2024/6/3

11:35

プロトコール名称 Cmab①⑤+ENCO±BINI連日 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2024/ 5/15 14:14
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2024/ 2/29	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 67.5IU/l	以上	ALT 82.5IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
処方 (前投薬) 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注 100mL デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン)	皮下埋込型一般注射液 初回はデキサート量注意 1 瓶 2 A	00:00					
Rp 02 中心静脈注射 レスタミン服用 ピラフトビ300mg連日内服 大塚生食注 100mL	皮下埋込型一般注射液 30分かけて メクトビ併用時は90mg連日内服 1 瓶	00:00					
Rp 03 中心静脈注射 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液 100mg 20mL 入りきらないので生食抜いて調製する	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 500 mg/m ²	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL	皮下埋込型一般注射液 アービタックスと同じ投与速度でフラ 1 袋	00:00					
	ー以下余白ー						

コメント

参考文献