

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2024/6/3

11:25

プロトコール名称 FOLFOX4+オプジーボ 2W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2023/10/25 11:08
投薬日数	2日	承認者	森木 康之
休薬日数	12日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/10/25	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN	20mg/dl	以上	Scr
			1.2mg/dl
			以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST	67.5IU/l	以上	ALT
			82.5IU/l
T-Bil	1.5mg/dl	以上	
			以上

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球	$30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球
			1%
好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板
			$7.5 \times 10^4 / \mu l$
ヘモグロビン	8g/dL	以下	
			以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)					
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) グレセトン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル)	皮下埋込型一般注射液 1 瓶 1 A 1 袋	00:00					
注射							
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) グレセトン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル)	皮下埋込型一般注射液 1 A 1 袋	00:00					
注射							
Rp 03 中心静脈注射 オプジーボ前後のフラッシュ 大塚生食注50mL	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 30分以上かけて 終了後30分以上空けてエルプラット開 大塚生食注100mL オプジーボ点滴静注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 インラインフィルター使用 1 瓶 240 mg/Body 【冷&暗保存】	00:00					
注射							
Rp 05 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液5%250mL レボホリナート注	皮下埋込型一般注射液 1 袋 100 mg/m ²	00:00	00:00				
	続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2024/6/3

11:25

プロトコール名称 FOLFOX4+オプジーボ 2W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2023/10/25 11:08
投薬日数	2日	承認者	森木 康之
休薬日数	12日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/10/25	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 20mg/dl	以上	Scr 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 67.5IU/l	以上	ALT 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)					
注射							
Rp 06 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液5% 250mL オキサリプラチン注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 LVと同時投与 1 袋 85 mg/m ²	00:00					
注射							
Rp 07 中心静脈注射 全開 大塚生食注50mL 5-FU注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00	00:00				
Rp 08 中心静脈注射 22時間かけて テルモ生食500mL 5-FU注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 600 mg/m ² 【冷所保存】	00:00	00:00				
Rp 09 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	皮下埋込型一般注射液 1 瓶 -以下余白-		00:00				

コメント

参考文献