

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2024/6/3

11:32

プロトコル名称 ★ドセタキセル①パージェタ①ハセプチン① 3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2023/12/22 14:41
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/12/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 67.5IU/l	以上	ALT 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)					
注射						
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00					
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 初回60分、2回目以降30分まで短縮可 側管① 投与後初回1時間2回目以降30分経過観 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 パージェタ点滴静注420mg/14mL 420 mg/Body 初回は840mg、2回目以降420mg/bodyです 【冷&暗保存】	00:00					
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 初回90分2回目以降30分まで短縮可 側管② 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 *トラスツズマブ注 6 mg/kg 初回は8mg/kg、2回目以降6mg/kgです 【冷&暗保存】	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 15分かけて 側管③ デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 2 瓶 (10~20mgで使用) グレネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋	00:00					
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1時間かけて 側管④ 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 ド)ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 75 mg/m ²	00:00					
						以下余白一

コメント

参考文献